

FOR THE USE ONLY OF A VETERINARIAN OR A HOSPITAL OR A LABORATORY OR A FARM

Deltamethrin 1.25%

butox[®] Vet



NOT FOR HUMAN USE - FOR ANIMAL TREATMENT ONLY

FOR EXTERNAL USE ONLY

NOT FOR USE IN AQUACULTURE

COMPOSITION :

Each ml contains :

Deltamethrin IP 12.5 mg

Solvent & Emulsifiers q.s.

PROPERTIES :

butox[®] is a highly effective ectoparasiticide. The active substance "Deltamethrin" is a pure isomer. The most active isomer of a composite ester. butox[®] has a wide spectrum of activity against ticks, mites, lice and flies affecting livestock. butox[®] is active against strains resistant to organophosphorous compounds and also has highly consistent action. butox[®] has a long acting effect on ectoparasites.

butox[®] is safe both for animals as well as for the users (humans).

butox[®] is very convenient to use and is very stable under normal conditions.

INDICATIONS :

For prevention and control of ectoparasitic infestations, like ticks lice, mites, and flies in cattle, buffaloes, sheep, goats, camels, horses, dogs & pigs.

ADMINISTRATION :

butox[®] is to be mixed with the required quantity of water and should be used as a spray or dip charging / topping up.

DOSE

Parasites	Spray or Dip charging		Topping up	
	ppm	butox [®] per lit. of water	ppm	butox [®] per lit. of water
Ticks	25.0	2 ml	37.50	3.0 ml
Mites	50.0	4 ml	75.00	6.0 ml
Lice	12.5	1 ml	18,75	1.5 ml
Flies	25.0	2 ml	37.50	3.0 ml

FREQUENCY OF TREATMENTS RECOMMENDED :

Mites : Two treatments at 8 days interval.

Ticks : First two treatments at 15 days interval and then treat depending on reinfestation.

Lice & Flies : As per requirement.

SPRAY :

Make a solution by adding a small quantity of water (for example 1 lit.) to the required quantity of butox[®].

Stir thoroughly and then fill it up with the required quantity of water to make the final spray solution.

Use a minimum quantity of 3 to 5 litres of spray solution per adult animal.

Ensure thorough coverage, particularly in the preferred sites of parasites.

PLUNGE DIPS :

a) Charging : According to the charging dosage, make a solution of the necessary quantity of butox[®]. Distribute the solution along with length of the dip, then stir for 10 minutes to obtain a perfect emulsion.

b) Topping up : After animals pass through, and as soon as the dip volume falls below 10% of its initial volume, topping up to be done by adding necessary quantity of water and butox[®].

GENERAL INSTRUCTIONS :

Stir thoroughly before animals pass through the dip. Ensure that 20 of the first animals are redipped during the course of dipping.

Ensure that the animals are neither tired nor thirsty before treatment.

Do not treat animals during warm hours.

Do not treat animals which are sick or with severe skin injuries.

STORAGE:

Store protected from light.

PRECAUTIONS :

Keep the product out of reach of pets and away from food stuffs. Do not eat, drink or smoke during treatment. Wash hands thoroughly with soap and cold water. Do not pour unused solution into rivers or ponds. If swallowed, do not induce vomiting. If large quantities have been swallowed, gastric lavage is advised. Avoid aspiration. Call a medical practitioner who will treat symptomatically.

WITHDRAWAL PERIOD : Meat - 20 days, Milk - 0 days

PRESENTATION : Bottles of 5ml, 15ml, 50 ml, 250 ml & 1 litre
Prescription product consult your Veterinarian.

® Registered trademark

Marketed by :

Intervet India Pvt. Ltd.

Sagar Complex, Bldg., B-1 Gala No. 12-14,

Ovali Village, Bhiwandi, Thane - 421 302

Consumer Care Number: +91-20-66294700/01

E-mail: info.india@merck.com Website: www.msd-animal-health.co.in

Manufactured by : Samrudh Pharmacoare Pvt. Ltd.

Unit No.1, Plot No.G 16/1, MIDC, Tarapur,

Boisar-401 506, Dist. Palghar



MSD

Animal Health

PO221001118 55 x 105 mm

केवल पशु चिकित्सक या अस्पताल या प्रयोगशाला या फार्म के उपयोग के लिए

डेल्टामेथ्रिन 1.25% बूटॉक्स® वेट



मानव उपयोग के लिए नहीं - केवल पशु उपचार के लिए

केवल बाहरी उपयोग के लिए

मत्स्य पालन में उपयोग के लिए नहीं

घटक:

प्रति मिली में है:

डेल्टामेथ्रिन आईपी 12.5 मिग्रा

सोल्वेंट एवं एम्यूलसिफायर्स क्यू. एस.

गुणधर्म:

बूटॉक्स® एक अत्यधिक प्रभावी बाह्य परजीवीनाशक है. इसका सक्रिय पदार्थ "डेल्टामेथ्रिन" एक शुद्ध समायवी है. संयुक्त एस्टर का सबसे सक्रिय समायवी है. बूटॉक्स में पशुओं को प्रभावित करने वाले किलनी, घुन, जूँ और मक्खियों के खिलाफ गतिविधि का एक व्यापक स्पेक्ट्रम है. बूटॉक्स® ऑर्गनोफॉस्फोरस यौगिकों के प्रतिरोधी उपभेदों के खिलाफ सक्रिय है और यह अत्यधिक सिलसिलेवार तरीके से क्रिया भी करता है. परजीवियों पर बूटॉक्स® का लंबे समय तक प्रभाव रहता है. बूटॉक्स® जानवरों के साथ-साथ उपयोगकर्ता (मनुष्य) दोनों के लिए सुरक्षित है.

बूटॉक्स® का उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है और यह सामान्य स्थितियों में बहुत स्थिर रहता है.

निर्देश:

गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ों, कुत्तों और सूअरों में किलनी, जूँ, घुन, और मक्खियों जैसे बाह्यपरजीवी संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए.

दिया जाना:

बूटॉक्स® पानी की आवश्यक मात्रा में मिलाया जाना चाहिए और स्प्रे या डिप चार्जिंग/टॉपिंग अप के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

खुराक:

परजीवी	स्प्रे या डिप चार्जिंग		टॉपिंग अप	
	पीपीएम	बूटॉक्स® प्रति लीटर पानी	पीपीएम	बूटॉक्स® प्रति लीटर पानी
किलनी	25.0	2 मिग्रा	37.50	3.0 मिग्रा
घुन	50.0	4 मिग्रा	75.00	6.0 मिग्रा
जूँ	12.5	1 मिग्रा	18.75	1.5 मिग्रा
मक्खी	25.0	2 मिग्रा	37.50	3.0 मिग्रा

उपचार की सुझाई गई आवृत्ति:

घुन: 8 दिन के अंतराल पर दो उपचार

किलनी: 15 दिनों के अंतराल पर पहले दो उपचार और फिर पुनःसंक्रमण होने के आधार पर.

जूँ और मक्खियाँ: आवश्यकता अनुसार.

स्त्रे:

बुटॉक्स® की आवश्यक मात्रा में थोड़ी मात्रा में (उदाहरण के लिए 1 लीटर) पानी मिलाकर घोल तैयार करें.

अच्छी तरह से हिला लें और फिर अंतिम स्त्रे घोल बनाने के लिए इसमें पानी की आवश्यक मात्रा डालें.

हर वयस्क जानवर के लिए न्यूनतम 3 से 5 लीटर मात्रा में स्त्रे घोल इस्तेमाल करें पूरी तरह से शरीर के हर हिस्से पर हवा लगना सुनिश्चित करें, विशेष रूप से परजीवियों की पसंदीदा जगह.

प्लंज डिप्स :

ए) चार्जिंग: चार्जिंग डोसेज के अनुसार, बुटॉक्स® की आवश्यक मात्रा का एक घोल बनाएं. घोल को डिप की लंबाई अनुसार पूरे में डाल दें. फिर एक सही मिश्रण पाने के लिए 10 मिनट हिलाएं.

बी) टॉपिंग अप: जानवरों के इसमें से गुजरने के बाद, और जैसे ही डिप की मात्रा इसकी शुरुआती मात्रा से 10% जितनी कम हो जाए, वैसे ही पानी और बुटॉक्स® की आवश्यक मात्रा मिलाकर टॉपिंग अप किया जाना चाहिए.

सामान्य निर्देश:

जानवरों के डिप में से गुजरने से पहले उसे पूरी तरह से हिलाएं. सुनिश्चित करें कि पहले 20 जानवर डिपिंग की प्रक्रिया के दुबारा डिप हो जाते हैं.

सुनिश्चित करें कि जानवर उपचार से पहले न तो थके हों न ही प्यासे हों.

गर्मी के समय जानवरों का इलाज न करें.

बीमार या त्वचा पर गंभीर चोट लगे जानवरों का इलाज न करें.

भंडारण:

प्रकाश से सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें.

एहतियात:

उत्पाद को पालतू जानवरों की पहुंच से दूर और खाने की चीजों से दूर रखें. इलाज के दौरान न तो खाएं, न तो पिएं, न ही धूम्रपान करें. हाथों को साबुन और ठंडे पानी से अच्छी तरह धोएं. इस्तेमाल न किए गए घोल को नदी या तालाब में न डालें. यदि निगल ली जाती है तो उल्टी करने के लिए न उकसाएं. यदि बहुत अधिक मात्रा निगल ली जाती है तो गैस्ट्रिक लैवेज की सलाह दी जाती है. इसे सांस से अंदर न खींचें. डॉक्टर को कॉल करें जो लक्षणों का इलाज करेंगे.

परहेज अवधि: मांस - 20 दिन, दूध - 0 दिन

प्रदर्शन: 5 मिली, 15 मिली, 50 मिली, 250 मिली और 1 लीटर प्रिस्क्रिप्शन उत्पाद की बोतल के लिए अपने पशु चिकित्सक से परामर्श करें.

® रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क

विपणनकर्ता:

इंटरवेट इंडिया प्रा. लि.

33, पुणे-नगर रोड, विमान नगर, पुणे-411014, भारत

फोन नंबर: +91 20 66294700-01, फैक्स: +91 20 66050410.

ई-मेल: info_india@merck.com, www.msd-animal-health.co.in

निर्माता: समुद्र फार्माकेयर प्रा. लि.

सुप्लायर नं.1, प्लॉट नं.जी 16/1, एमआईडीसी, तारपुर,

बोइसर - 401 506, जिला. पालघर



MSD

Animal Health

PO221001118 55 x 105 mm

केवळ पशुवैद्यकीय किंवा रुग्णालय किंवा प्रयोगशाळांमध्ये वापरण्यासाठी किंवा शेतीच्या वापरासाठी

डेल्टामेथ्रिन 1.25% ब्यूटॉक्स® वेट



मानवी वापरासाठी नाही - केवळ प्राण्यांच्या उपचारासाठी आहे

फक्त बाह्य वापरासाठी आहे

मत्स्यपालनात वापरण्यासाठी नाही

घटक:

प्रत्येक मिलीमध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत :

डेल्टामेथ्रिन आयपी 12.5 मिलीग्राम

सॉल्वेंट आणि एम्युल्सिफायर्सकॉन्टॅक्टि सफिशिएंट

गुणधर्म :

ब्यूटॉक्स® एक अत्यंत प्रभावी बाह्यपरजीवीनाशक आहे. सक्रिय पदार्थ डेल्टामेथ्रिन एक शुद्ध आयसोमर आहे. संमिश्र एस्टरचा एक सर्वात सक्रिय आइसोमर आहे. ब्यूटॉक्स® मध्ये गोचीड, माइट्स, उवा आणि माश्यांवर परिणाम करणा -या क्रियाकलापांची विस्तृत श्रेणी आहे. ब्यूटॉक्स® हे ऑर्गनोफॉस्फोरस परजीवींच्या विरुद्ध प्रतिरोधक सक्रिय आहे आणि त्यामध्ये अत्यंत सुसंगत क्रिया देखील आहे. ब्यूटॉक्स® चा बाह्यपरजीवी दीर्घकाळ प्रभाव असतो.

ब्यूटॉक्स® हे प्राण्यांसाठी तसेच वापरकर्त्यांसाठी (मानवांसाठी) सुरक्षित आहे.

ब्यूटॉक्स® वापरण्यास अतिशय सोयीस्कर आहे आणि सामान्य परिस्थितीत अतिशय स्थिर आहे.

सूचना :

गाई, म्हशी, मेंढ्या, शेळ्या, उंट घोडे, कुत्रे आणि डुकरे यांच्यामधील बाह्यपरजीवींचा जसे गोचीड, उवा, माइट्स यांचा उपद्रव प्रतिबंधित आणि नियंत्रित करण्यासाठी वापर करावा.

प्रशासन :

ब्यूटॉक्स® आवश्यक प्रमाणात पाण्यात मिसळावे आणि स्प्रे किंवा डिप चार्जिंग किंवा टॉपिंग म्हणून वापरले जावे.

डोस :

बाह्यपरजीवी	स्प्रे किंवा डिप चार्जिंग		टॉपिंग	
	पीपीएम	ब्यूटॉक्स® प्रति लिटर पाण्यात	पीपीएम	ब्यूटॉक्स® प्रति लिटर पाण्यात
गोचीड	25.0	2 मिली	37.50	3.0 मिली
माइट्स	50.0	4 मिली	75.00	6.0 मिली
उवा	12.5	1 मिली	18.75	1.5 मिली
माश्या	25.0	2 मिली	37.50	3.0 मिली

शिफारस केलेली उपचारांची वारंवारता :

माइट्स : 8 दिवसांच्या अंतराने दोन उपचार.

गोचीड : पहिले दोन उपचार 15 दिवसांच्या अंतराने आणि नंतर प्रार्दुभावाच्या तीव्रतेनुसार उपचार अवलंबून आहेत.

उवा आणि माश्या : गरजेनुसार.

फवारणी :

ब्यूटॉक्स® आवश्यक प्रमाणात (उदाहरणार्थ 1 लिटर) थोड्या प्रमाणात पाणी घालून द्रावण तयार करा.

नीट ढवळून घ्यावे आणि नंतर अंतिम फवारणी द्रावण तयार करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात पाण्याने भरावे.

ग्रौंड जनावरांसाठी किमान 3 ते 5 लिटर फवारणी द्रावणाचा वापर करा.

विशेषतः परजीवींच्या पशुच्यां रहाणाच्या शरीरावरील जागेवर संपूर्ण कव्हेरेज सुनिश्चित करा.

प्लंज डिप्स :

अ) चार्जिंग: चार्जिंग डोसनुसार आवश्यक प्रमाणात ब्यूटॉक्सचे द्रावण तयार करा. डुबकीच्या लांबीसह द्रावण वितरित करा, नंतर एक परिपूर्ण इमल्शन तयार करण्यासाठी 10 मिनिटे ढवळून घ्या.

ब) टॉपिंग: जनावरे गेल्यानंतर आणि बुडण्याचे प्रमाण त्याच्या सुरुवातीच्या व्हॉल्यूमच्या 10% पेक्षा खाली आल्यावर आवश्यक प्रमाणात पाणी आणि ब्यूटॉक्स एं मिश्रित करून केले जाईल.

सामान्य सूचना :

जनावरे बुडून जाण्यापूर्वी पूर्णपणे नीट ढवळून घ्या. बुडवताना पहिल्या 20 जनावरांना परत पाठवल्याची खात्री करा.

उपचार करण्यापूर्वी प्राणी थकलेले किंवा तहानलेले नाहीत याची खात्री घ्या. उबदार तासांमध्ये (दुपारच्या वेळी) प्राण्यांवर उपचार करू नका.

आजारी असलेल्या किंवा त्वचेच्या गंभीर जखमा असलेल्या प्राण्यांवर उपचार करू नका.

साठवण :

प्रकाशापासून संरक्षित ठिकाणी ठेवा.

सावधगिरी :

उत्पादन, पाळीव प्राण्यांच्या आवाक्याबाहेर आणि अन्नपदार्थांपासून दूर ठेवा. उपचारादरम्यान अन्नाचे सेवन, मद्यपान किंवा धूम्रपान करू नका. हात साबण आणि थंड पाण्याने चांगले धुवा. नद्या किंवा तलावांमध्ये न वापरलेले द्रावण घालू नका. हे द्रावण गिळल्यास उलट्या होऊ देऊ नका. जर मोठ्या प्रमाणात हे द्रावण गिळले गेले असेल तर गॅस्ट्रिक लॅवेंजचा सल्ला दिला जातो. आकांक्षा टाळा. एखाद्या वैद्यकीय व्यावसायिकाला कॉल करा जो लक्षणात्मक उपचार करेल.

जनावरांपासून काढण्याचा कालावधी : मांस 20 दिवस दूध 0 दिवस.

सादरीकरण : 5 एमएल, 15 एमएल, 50 एमएल, 250 एमएल आणि 1 लिटरच्या बाटल्या.

पशुवैद्यकांच्या सल्लाने वापरा.

® नोंदणीकृत ट्रेडमार्क

यांद्वारे विपणन :

इंटरव्हेट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

33, पुणे-नगर रोड, शिवाल नगर, पुणे-411014, भारत
फोन नंबर: +91 20 66294700-01, फॅक्स: +91 20 66050410.
ईमेल : info_india@merck.com, www.msd-animalHealth.co.in

यांद्वारे निर्मित : समृद्ध फार्मा केअर प्रायव्हेट लिमिटेड
युनिट क्रमांक 1 प्लॉट क्रमांक जी 16/ 1 एमआयडीसी, तारापूर,
बॉम्बे-401506 जिल्हा पालघर



PO22001118 55 x 105 mm

IN-BUX-210800002

ಪಕುವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 1.25%

ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್ ವೆಟ್



ಮಾನವ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ - ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಬಾಹ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಜಲಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ

ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ ಐಪಿ

12.5 ಮಿಗ್ರಾಂ

ದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಎಮುಲಿಸೈಯರ್‌ಗಳು

ಕ್ಯೂ. ರು.

ಗುಣಗಳು:

ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್® ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಲೋಪರಾಸಿಟೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತು "ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್" ಶುದ್ಧ ಐಸೋಮರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ವಸ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಐಸೋಮರ್. ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್® ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಉಣ್ಣೆ ಹೇನು, ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನೋಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್® ಆರ್ಗನೊಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾದ ತಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್® ಎಕ್ಸ್‌ಲೋಪರಾಸಿಟೈಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್® ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ (ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ) ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್® ಬಳಸಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆಗಳು:

ಎಕ್ಸ್‌ಲೋಪ್ಯಾರಾಸಿಟೈಡ್ ಸೋಂಕುಗಳಾದ ಉಣ್ಣೆ ನೋಣ, ಹೇನು, ಚಿಟ್ಟೆ, ಪರೋಪಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು, ಒಂಟೆ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ.

ಆಡಳಿತ:

ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್® ಅನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಡಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ / ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಡೋಸಸ್

ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು	ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಅದ್ದುವ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್		ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್	
	ಪಿಪಿಎಂ	ನೀರಿನ ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್® ಪ್ರತಿ ಲಿ.	ಪಿಪಿಎಂ	ನೀರಿನ ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್® ಪ್ರತಿ ಲಿ.
ಉಣ್ಣೆ	25.0	2 ಮಿಲಿ	37.50	3.0 ಮಿಲಿ
ಮಿಟೆ	50.0	4 ಮಿಲಿ	75.00	6.0 ಮಿಲಿ
ಹೇನು	12.5	1 ಮಿಲಿ	18.75	1.5 ಮಿಲಿ
ಚಿಟ್ಟೆ	25.0	2 ಮಿಲಿ	37.50	3.0 ಮಿಲಿ

ತಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಅವಕಾಶ:

ಮಿಟೆ: 8 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು.

ಉಣ್ಣೆ: ಮೊದಲ ಎರಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು 15 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮರುಹುಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಹೇನು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ: ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಸ್ವೇ:

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್[®] ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1 ಲೀ.) ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ವೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಪ್ರತಿ ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 5 ಲೀಟರ್ ಸ್ವೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಿ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕವರೆಜ್ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ಲಾಂಗ್ ಡಿಪ್:

ಎ) ಬಾರ್ಬಿಂಗ್: ಬಾರ್ಬಿಂಗ್ ಡೋಸೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್[®] ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅದ್ದಿದ ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಮಲ್ಷನ್ ಪಡೆಯಲು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆರೆಸಿ.

ಬಿ)ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಪ್: ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದ್ದಿದ ಪರಿಮಾಣವು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಮಾಣದ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ಬ್ಯುಟಾಕ್ಸ್[®] ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು:

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದ್ದಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಮುಳುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 20 ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಣಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಡಿ.

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಚರ್ಮದ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಡಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:

ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಡಿ. ನುಂಗಿದರೆ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ: ಮಾಂಸ - 20 ದಿನಗಳು, ಹಾಲು - 0 ದಿನಗಳು.

ಪ್ರಸ್ತುತಿ: 5 ಮಿಲಿ, 15 ಮಿಲಿ, 50 ಮಿಲಿ, 250 ಮಿಲಿ, ಮತ್ತು 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವಕುಲವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

©ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್

ಇವರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

ಇಂಟರ್ವೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್

33, ಪುಣೆ-ನಗರ ರಸ್ತೆ, ವಿಮಾನ ನಗರ, ಪುಣೆ-411014, ಭಾರತ

ದೂರವಾರ್ತೆ, ಸಂಖ್ಯೆ: +91 20 66294700-01, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91 20 66050410.

ಇ-ಮೇಲ್: info_india@merck.com, www.msd-animalHealth.co.in

ತಯಾರಿಸಿದವರು: ಸಮ್‌ವೆಡ್ ಫಾರ್ಮಾಕೋಲ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಫಾಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 16/1, ಎಂಐಸಿ, ತಾರಾವುರ,

ಬೋಯರ್ - 401 506, ಕೆ.ಆರ್. ಪಾಲ್ಘಾಟ್



MSD

Animal Health

PO221001118 55 x 105 mm

IN-BUX-210900002

ஒரு காந்தை மருத்துவர் அல்லது மருத்துவமனை அல்லது ஆய்வகம் அல்லது பண்ணைப் பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே

டெல்டாமெத்ரின் 1.25% பூடாக்ஸ்[®] வெட்



மனித பயன்பாட்டுக்கு அல்ல - விலங்கு சிகிச்சைக்கு மட்டுமே

வெளிப்புற பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்

மீன் பண்ணையில் பயன்படுத்தக் கூடாது

சேர்மானம்:

ஒவ்வொரு மிலி-ன் உள்ளடக்கம்:

டெல்டாமெத்ரின் ஐபி

12.5 மிகி

சால்வன்ட் மற்றும் எம்ஸிஃபையர்ஸ்

q.s.

தன்மைகள்:

விலங்குகளில் வெளிஓட்டுண்ணிகளை அழிப்பதில் உயர் செயலாற்றல் கொண்ட ஒன்றாக பூடாக்ஸ்[®] விளங்குகிறது. இதில் செயலாற்றும் பொருளான "டெல்டாமெத்ரின்" ஒரு கத்தமான ஐசோமர் ஆகும். ஒரு காம்போசைட் எஸ்டரில் மிக செயலாற்றல் கொண்ட ஐசோமர் ஆக இருக்கிறது. காந்தைகளை பாதிக்கும் தெள்ளுப்புச்சிகள், சிவந்திப்பேன்கள், பேன் மற்றும் ஈக்களுக்கு எதிராக ஒரு பரந்த வீரியமான செயல்பாட்டை கொண்டுள்ளது. மேலும் ஆர்கனோபாஸ்பரஸ் கலவைகளுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் கொண்ட ஸ்டெராயின்சுக்கு எதிராகவும் பூடாக்ஸ்[®] செயலாற்றல் உள்ளது மற்றும் உயர் சீரான செயல்பாட்டையும் கொண்டுள்ளது. வெளிஓட்டுண்ணிகள் மீது ஒரு நீண்ட கால செயலாற்றும் திறனை பூடாக்ஸ்[®] கொண்டுள்ளது.

பூடாக்ஸ்[®] விலங்குகள், அதே போல் பயன்படுத்துபவர்கள் (மனிதர்கள்) என இருவருக்குமே பாதுகாப்பானது.

பூடாக்ஸ்[®] பயன்படுத்துவதற்கு மிக செளகரியமானது மற்றும் இயல்பான நிலைகளின் கீழ் மிகவும் நிலையானது.

அறிகுறிகள்:

மாடுகள், எருமைகள், செம்மறியாடு, வெள்ளாடுகள், ஓட்டகங்கள், குதிரைகள், நாப்கள் மற்றும் பன்றிகளுக்கு தெள்ளிப்புச்சிகள், பேன், சிவந்திப்பேன்கள் மற்றும் ஈக்கள் போன்ற வெளிஓட்டுண்ணிகள் பாதிப்பை தடுக்கிறது மற்றும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

பயன்படுத்துதல்:

பூடாக்ஸ்[®] மருந்தை தேவையான அளவு தண்ணீருடன் கலக்க வேண்டும் மற்றும் அதனை ஒரு தெளிப்பாக அல்லது குட்டையில் அமிழ்த்தி எடுத்தல் / மேலே ஊற்றுவது என பயன்படுத்த வேண்டும்.

டோஸ்:

ஓட்டுண்ணிகள்	தெளிப்பு அல்லது அமிழ்த்தி எடுத்தல்		மேலே ஊற்றுவது	
	பிபிஎம்	ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு பூடாக்ஸ் [®]	பிபிஎம்	ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு பூடாக்ஸ் [®]
தெள்ளுப்புச்சிகள்	25.0	2 மிலி	37.50	3.0 மிலி
சிவந்திப்பேன்கள்	50.0	4 மிலி	75.00	6.0 மிலி
பேன்	12.5	1 மிலி	18.75	1.5 மிலி
ஈக்கள்	25.0	2 மிலி	37.50	3.0 மிலி

பரிந்துரைக்கப்படும் சிகிச்சை அடுக்குநிகழ்வு:

சிலந்திப்பேன்கள்: இரண்டு சிகிச்சைகள் 8 நாட்கள் இடைவெளியில்.

தொள்ளுப்புச்சிகள்: முதல் இரண்டு சிகிச்சைகள் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் மற்றும் பிறகு மீள்தொற்று அடிப்படையில் சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பேன்கள் மற்றும் ஈக்கள்: தேவைக்கேற்ப.

தெளிப்பு:

பூடாக்ஸ்® தேவையான அளவுடன் சிந்திதளவு தண்ணீர் சேர்த்து (உதாரணத்துக்கு 1 லிட்டர்) ஒரு கரைசலை தயாரிக்கவும்.

நன்றாகக் கலக்கவும் மற்றும் பிறகு இறுதி தெளிப்பு கரைசலை தயாரிக்க தேவையான அளவு தண்ணீரை அதில் நிரப்புகள்.

வயது வந்த ஒரு விலங்கிற்கு குறைந்தது 3 முதல் 5 லிட்டர் தெளிப்பு கரைசலை பயன்படுத்தவும்.

முழுமையாக மருந்து கரைசலை, குறிப்பாக ஒட்டுண்ணிகள் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் தெளிப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.

மருந்து குட்டையில் அமியு வைத்தல்:

ஏ) சார்ஜிங்: சார்ஜிங் டோசுக்கு ஏற்ப, பூடாக்ஸ்® தேவையான அளவில் ஒரு கரைசலை தயாரிக்கவும். குழி முழுவதும் கரைசலை நிரம்பியிருக்கும்படி செய்யவும், பிறகு ஒரு சரியான எம்ஸன் பெற 10 நிமிடங்களுக்கு நன்றாகக் கலக்கவும்.

பி) டாப்பிங் அப்: விலங்குகள் இந்த மருந்து கரைசல் தண்ணீரில் நடந்து சென்றதும், மற்றும் அமிழ்த்தும் அளவு அதன் ஆரம்ப அளவிலிருந்து 10% கீழே குறைந்ததும், தேவையான அளவு தண்ணீர் மற்றும் பூடாக்ஸ்® சேர்த்து டாப்பிங் அப் செய்யப்பட வேண்டும்.

பொதுவான அறிவுறுத்தல்கள்:

மருந்து குட்டையில் மாடுகள் செல்லும் மூன்று நன்றாகக் கலக்கவும். முதல் 20 விலங்குகள் அமிழ்த்தி முடித்ததும் செயல்முறையின் போது திரும்பவும் குட்டையில் அமிழ்வதை உறுதி செய்யவும்.

சிகிச்சைக்கு மூன்று விலங்குகள் களைப்பாக அல்லது தாகமாக இருக்கக் கூடாது என்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.

வெப்பமான நேரத்தின் போது விலங்குகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக் கூடாது. நோயுற்ற அல்லது கடுமையான தோல் காயங்கள் உள்ள விலங்குகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக் கூடாது.

சேமித்தல்:

வெயிலில் இருந்து பாதுகாக்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்:

மருந்துப் பொருளை செல்லப்பிராணிகளுக்கு கிடைக்காத இடத்தில் மற்றும் உணவுப் பொருட்களில் இருந்து தள்ளி வைக்கவும். சிகிச்சையின் போது சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ அல்லது புகைக்கவோ கூடாது. கைகளை நன்றாக சோப்பு போட்டு குளிர்ந்த தண்ணீரில் கழுவவும். பயன்படுத்தாத கரைசலை ஆறுகள் அல்லது குளங்களில் ஊற்றக் கூடாது. விழுங்கி விட்டால், வாந்தி வர வைக்காதீர்கள். பெரிய அளவில் விழுங்கி விட்டிருந்தால், இரைப்பை கழுவலுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மூச்சுக்குழலுக்குள் செல்வதை தவிர்க்கவும். ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும் அவர் அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிப்பார்.

விலகும் காலம்: இரைச்சி - 20 நாட்கள், பால் - 0 நாள்

வழங்கல்: 5 மிலி, 15 மிலி, 50 மிலி, 250 மிலி மற்றும் 1 லிட்டர் பாட்டில்களில் பரிந்துரைப்பு பொருளுக்கு உங்கள் கால்நடை மருத்துவருடன் ஆலோசிக்கவும்.

உபதிவுப் பெற்ற டிரேட்மார்க்

சந்தைப்படுத்துவது:

இன்டர்வெட் இந்தியா பிரைவேட் லிட்.

33, புளே-நகர் சாலை, விமன் நகர், புளே-411014, இந்தியா
போன் எண்: +91 20 66294700-01, ஃபாக்ஸ்: +91 20 66050410.

மின்னஞ்சல்: info_india@merck.com, www.msd-animal-health.co.in

தயாரிப்பாளர்: சங்குத் பார்மாகேர் பி. லிட்.

பூனிட் எண் 1, பன்னிட் எண் ஜி 16/1, எம்ஜிடிசி, தாராப்பூர்,

பொய்சர்-401 506, மாவட்டம் பாஸ்கர்



PO22001118 55 x 105 mm

IN-BUX-210800002

కేవలం పశువైద్యుల లేదా ఆసుపత్రి లేదా ప్రయోగశాల లేదా పాలాల ఉపయోగం కోసం

డెల్టామెత్రిన్ 1.25% బ్యూటాక్స్[®] వెట్



మనుషుల ఉపయోగం కోసం కాదు - జంతువుల చికిత్స కోసం మాత్రమే

బయట ఉపయోగించుటకు మాత్రమే

జలవ్యవసాయంలో ఉపయోగం కోసం కాదు

కూర్పు

ప్రతి మి.లీ లో :

డెల్టామెత్రిన్ ఐపి

12.5 మిల్లీ గ్రా

ద్రావకం మరియు ఎమెల్సిఫైర్స్

క్యూ యస్

లక్షణాలు:

బ్యూటాక్స్[®] బాహ్య పరాన్నజీవులపై ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. క్రియాశీల పదార్థం "డెల్టామెత్రిన్" అనేది ఒక స్వచ్ఛమైన ఐసోమర్. మిశ్రమ ఈస్టర్ యొక్క అత్యంత క్రియాశీల ఐసోమర్. పశుసంపదను ప్రభావితం చేసే పేలు, పురుగులు, పేను మరియు ఈగలకు వ్యతిరేకంగా బ్యూటాక్స్[®] విస్తృతమైన కార్యాచరణ ను కలిగి ఉంది. ఆర్గానోఫాస్ఫరస్ సమ్మేళనల నిరోధక జాతులకు వ్యతిరేకంగా బ్యూటాక్స్[®] చురుకుగా ఉంటుంది మరియు అత్యంత స్థిరమైన చర్యను కలిగి ఉంటుంది. బ్యూటాక్స్[®] బాహ్య పరాన్నజీవులపై దీర్ఘకాలం పనిచేసే ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. బ్యూటాక్స్[®] జంతువులకు మరియు వినియోగదారులకు (మనుషులు) సురక్షితం. బ్యూటాక్స్[®] ఉపయోగించడానికి చాలా సౌకర్యవంతంగా మరియు సాధారణ పరిస్థితులలో స్థిరంగా ఉంటుంది.

నూచనలు:

పురుగులు మరియు ఈగలు, పశువులు, గేదెలు, గొర్రెలు, మేకలు, ఒంటెలు, గుర్రాలు, కుక్కలు & పందులు వంటి బాహ్య పరాన్నజీవుల ఇన్సెక్షన్ల నివారణ మరియు నియంత్రణ కోసం.

పరిపాలన

బ్యూటాక్స్[®]ను[®] అవసరమైన పరిమాణంలో నీటితో కలపాలి మరియు దీనిని స్ప్రే లేదా డిప్ ఛార్జింగ్/టాపింగ్గా ఉపయోగించాలి.

మోతాదు

పరాన్నజీవులు	పిచికారీ లేదా డిప్ ఛార్జింగ్		టాప్ అప్	
	పిపిఎమ్	లీటరు నీటికి బ్యూటాక్స్ [®]	పిపిఎమ్	లీటరు నీటికి బ్యూటాక్స్ [®]
పేలు	25.0	2 మి.లీ	37.50	3.0 మి.లీ
పురుగులు	50.0	4 మి.లీ	75.00	6.0 మి.లీ
పేను	12.5	1 మి.లీ	18.75	1.5 మి.లీ
ఈగలు	25.0	2 మి.లీ	37.50	3.0 మి.లీ

సిఫార్సు చేసిన చికిత్సల తరుమదనం:

పురుగులు: 8 రోజుల వ్యవధిలో రెండు చికిత్సలు

పేలు - 15 రోజుల వ్యవధిలో రెండు చికిత్సలు తర్వాత మళ్ళీ పురుగు పుట్టుక బట్టి చికిత్స చేయండి

పేను & ఈగలు: అవసరాన్ని బట్టి

స్ప్రే:

చిన్న పరిమాణంలో నీటిని (ఉదాహరణకు 1 లీ) మరియు అవసరమైన పరిమాణంలో బ్యూటాక్స్‌ను[®] తీసుకొని కూర్చి ఒక ద్రవం లాగా తయారుచేయండి. దాన్ని కలుపు తూ అవసరమైన పరిమాణంలో నీటిని పోసి ఒక ఖచ్చితమైన ద్రవం మాదిరిగా వచ్చేలా చేసుకోండి.

పెద్ద జంతువులకు కనీసం 3 నుండి 5 లీటర్ల స్ప్రే ద్రవణాన్ని ఉపయోగించండి. కవరేజ్ ద్వారా నిర్ధారించుకోండి, ముఖ్యంగా పరాన్నజీవుల ప్రాధాన్యత ఉన్న ప్రదేశాలలో.

నింపడం:

నింపడం మోతాదు ప్రకారం, అవసరమైన పరిమాణంలోని బ్యూటాక్స్[®] ద్రావణాన్ని తయారు చేయండి. లోతు ఎంత పొడవుంటుందో అంత ద్రవణాన్ని పంపిణీ చేయండి, ఖచ్చితమైన రంగు పొందడానికి 10 నిమిషాలు కలుపండి. టాప్ అఫ్: జంతువులు వెళ్ళిన తర్వాత ద్రావణం యొక్క పరిమాణం దాని ప్రారంభ పరిమాణం కంటే 10% తక్కువకు పడిపోయిన వెంటనే, అవసరమైన పరిమాణంలో నీరు మరియు బ్యూటాక్స్[®] పోయాలి

సాధారణ సూచనలు:

జంతువులు లోతు గుండా వెళ్ళే ముందు ద్రావణాన్ని బాగా కలపండి. ఈ లోతు లో జంతువులు మునిగేటప్పుడు మొదటి 20 జంతువులు మళ్ళీ మునిగాయ చూసుకోండి. చికిత్సకు ముందు జంతువులకు అలసట లేదా దాహం వేయకుండా చూసుకోండి. వేడిగా ఉన్న సమయంలో జంతువులకు చికిత్స చేయవద్దు . అనారోగ్యంతో లేదా తీవ్రమైన చర్మ గాయాలతో ఉన్న జంతువులకు చికిత్స చేయవద్దు .

నిలవచేసే చోటు: కాంతి నుండి రక్షించబడిన ఒక ప్రదేశంలో నిల్వ చేయండి

ముందుజాగ్రత్తలు:

పెంపుడు జంతువులకు మరియు ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచండి. చికిత్స సమయంలో తినడం, త్రాగడం లేదా ధూమపానం చేయవద్దు. నబ్బు మరియు చల్లటి నీటితో చేతులు కడుక్కోండి. నదులు లేదా చెరువులలో ఉపయోగించని ద్రవణాన్ని పోయవద్దు . మింగినట్లయితే, వాంతి చేయకండి. పెద్ద పరిమాణంలో మింగినట్లయితే, పోయవద్దు గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ సూచించబడుతుంది. ఉ త్వర పడకండి.

ఉపసంహరణ సమయం: మాంసం - 20 రోజులు పాలు - 0 రోజులు

లభ్యత: 5 మి.లీ, 15 మి.లీ, 50 మి.లీ, 250 మి.లీ & 1 లీ సీసాలు
మందులను ఎలా ఉపయోగించాలో మీ పశువైద్యుడిని సంప్రదించండి.

తిరిగివేయబడిన

ద్వారా విక్రయించబడింది:

ఇంటర్నేట్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

33 ఫూలే-పల్లె రోడ్, ఏమాన్ పల్లె, ఫూలే-411014, భారతదేశం

ఫోను నెంబరు: +91 20 66294700-01, ఫ్యాక్స్: +91 20 66060410

వెబ్సైట్: info_india@merck.com, www.msd-animal-health.co.in

తయారుచేసినవారు: సమ్మెట్ ఫార్మాస్ డివిజన్
యాపిల్ నెం 1, ఫుల్ నెం 1, 15/1 ఎమ్మెడికల్ లాంఛర్,
బోయిస్ - 401 506, తిర్నూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



PO221001118 55 x 105 mm

IN-BUX-210600002

কেবলমাত্র একটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে বা একটি হাসপাতালে বা একটি গবেষণাগারে বা একটি ফার্ম বা খামারে ব্যবহারের জন্য।

ডেল্টামেথ্রিন 1.25% বুটোল্ল® ভেট



মানুষের ব্যবহারযোগ্য নয় - কেবলমাত্র পশু চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা উচিত

কেবলমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য

জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়

উপকরণ:

প্রতি মিলি-তে রয়েছে:

ডেল্টামেথ্রিন আইপি 12.5 মিগ্রা

সলভেন্ট এবং ইমালসিফায়ারস্ পরিমাণ মতো

প্রস্তুতি:

বুটোল্ল® হল একটি অত্যন্ত কার্যকরী এক্টোপ্যারাসিটিসাইড। সক্রিয় উপাদান “ডেল্টামেথ্রিন” একটি বিশুদ্ধ আইসোমার। একটি কম্পোজিট এসটারের সবথেকে সক্রিয় আইসোমার। বুটোল্ল® টিকস্, মাইটস্, উকুন এবং গৃহপালিত পশুগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে এইজাতীয় মাছিগুলির বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত ধারার কার্যকারিতা সম্পন্ন পণ্য। বুটোল্ল® অর্গ্যানোফসফরাস যৌগের চাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় এবং এর অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্রব্যাও রয়েছে। বুটোল্ল® কার্যকরীভাবে দীর্ঘমেয়াদীরূপে এক্টোপ্যারাসাইট নিয়ন্ত্রণ করে। বুটোল্ল® পশু এবং ব্যবহারকারীদের (মানুষ) উভয়ের পক্ষেই নিরাপদ।

বুটোল্ল® ব্যবহার করা অত্যন্ত সুবিধাজনক এবং স্বাভাবিক অবস্থায় অত্যন্ত স্থিতিশীল।

নির্দেশাবলী:

টিকস্, উকুন, মাইটস্ এবং গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট, ঘোড়া, কুকুর এবং শূকরের মাছির মত এক্টোপ্যারাসিটিক উপদ্রব প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

প্রয়োগ:

বুটোল্ল® প্রয়োজনীয় পরিমাণ জলের সাথে মিশিয়ে স্প্রে বা ডিপ চার্জিং / টপিং আপ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

মাত্রা:

প্যারাসাইট	স্প্রে বা ডিপ চার্জিং		টপিং আপ	
	পিপিএম	প্রতি লিটার জলে বুটোল্ল®	পিপিএম	প্রতি লিটার জলে বুটোল্ল®
টিকস্	25.0	2 মিলি	37.50	3.0 মিলি
মাইটস্	50.0	4 মিলি	75.00	6.0 মিলি
উকুন	12.5	1 মিলি	18.75	1.5 মিলি
মাছি	25.0	2 মিলি	37.50	3.0 মিলি

চিকিৎসার প্রস্তাবিত সংখ্যা:

মাইটস : 8 দিনের ব্যবধানে দুইবার চিকিৎসা

টিকস্ : 15 দিনের ব্যবধানে প্রথম দুইটি চিকিৎসা এবং তারপরে পুনরায় আবির্ভাবের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করুন।

উকুন এবং মাছি: প্রয়োজন অনুযায়ী।

স্ট্রেপ: প্রয়োজনীয় পরিমাণ ব্যুটোজ[®]-এ অল্প পরিমাণে জল (উদাহরণস্বরূপ 1 লিটার) যোগ করে একটি সমাধান প্রস্তুত করুন ভালোভাবে নাড়ান এবং তারপরে চূড়ান্ত স্ট্রেপ সমাধান প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল দিয়ে সেটিকে পূরণ করুন। প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক পশু পিছু ন্যূনতম 3 থেকে 5 লিটার পরিমাণ স্ট্রেপ দ্রবণ ব্যবহার করুন। সর্বোত্তমরূপে কভারেজ নিশ্চিত করুন, বিশেষত প্যারাসাইটগুলির যে সকল স্থানে হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে সেই অংশগুলিতে।

ডুবানো বা ডিপ করা:

ক) চার্জিং: চার্জিং ডোজ অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় পরিমাণ ব্যুটোজ[®]-এর সমাধান প্রস্তুত করুন। ডিপ করার জন্য উচ্চতা অনুযায়ী সলিউশন দিন, তারপর একটি নিখুঁত ইমালসন পাওয়ার জন্য 10 মিনিট ধরে ভালোভাবে নাড়ান।

খ) টপিং আপ: পশুদের মধ্যে পরিচালনা করার পরে, এবং ডিপ করার পরিমাণ তার প্রাথমিক পরিমাণের 10%-এর নীচে নেমে আসার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল এবং ব্যুটোজ[®] যোগ করে টপিং আপ করতে হবে।

সাধারণ নির্দেশাবলী:

পশুগুলিকে ডিপ করার পূর্বে মিশ্রণটিকে ভালোভাবে নাড়িয়ে নিন। ডিপ করার সময় সুনিশ্চিত করুন যে প্রথম 20টি পশুকে পুনরায় ডিপ করা হয়েছে। ক্লান্ত এবং তৃষ্ণার্ত পশুকে ডিপ করবেন না। গরমের সময়ে পশুদের উপর এটি প্রয়োগ করবেন না। যে সকল প্রাণী অসুস্থ এবং ত্বকে গুরুতররূপে ক্ষত রয়েছে তাদের উপর এটি প্রয়োগ করবেন না।

সংরক্ষণ: আলোর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখুন।

সতর্কতা: পণ্যটিকে পোষ্য প্রাণী এবং খাদ্যসামগ্রীর থেকে দূরে রাখুন। প্রয়োগ করার সময় আহাৰ করা, পান করা বা ধূমপান করা থেকে বিরত থাকুন। সাবান এবং জল দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন। নদী বা পুকুরে অব্যবহৃত মিশ্রণটিকে ফেলবেন না। যদি পেটে চলে যায়, তাহলে জোর করে বমি করাবেন না। যদি বেশী পরিমাণে পেটে চলে যায় তাহলে গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ-এর পরামর্শ প্রদান করা হয়। স্ট্রেপ বাস্পে শ্বাস নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। একজন চিকিৎসককে কল করুন যিনি লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন।

প্রত্যাহারের সময়: মাংস - 20 দিন, দুধ - 0 দিন

পেশ করা হয়েছে - 5মিলি, 15মিলি, 50মিলি, 250মিলি এবং 1 লিটার-এর বোতল প্রস্তাবিত পশুর বিষয়ে আপনার পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

© রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিপণনকারী:

ইন্টারনেট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

33, পুনে-নগর রোড, বিমল নগর, পুনে-411014, ভারত
ফোন নং: 91 20 66294700-01, ফ্যাক্স: 91 20 66050410.

ই-মেইল: info_india@merck.com, www.msd-animal-health.co.in



MSD

Animal Health

প্রস্তুতকার্তা: সমৃদ্ধ ফার্মাকোর প্রাইভেট লিমিটেড
ইউনিট নং. 1, প্রট. নং. জি 16 / 1, এমআইভিসি, অরাপুর,
বৈসার - 401 506, জেলা পালঘর

PO221001118 55 x 105 mm